

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION "ALSACE ET LORRAINE"

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MEUSE, MOSELLE, VOSGES)

Cité Administrative — 67 - STRASBOURG

Tél. 34-14-63 - Poste 93

ABONNEMENT ANNUEL 25 F

C.C.P. STRASBOURG 55-08-00 F

Régisseur de recettes D.D.A.

2, Rue des Mineurs

67 - STRASBOURG

Supplément n° 1 au Bulletin du mois de Juillet 1970

10 Juillet 1970

Information

GRANDES CULTURES

- MAIS -

PYRALE DU MAIS

Les vols de Pyrale du maïs en élevage ont débuté le 22 Juin dans la région de COLMAR, le 4 Juillet dans l'ACKERLAND - KOCHERSBERG et le 8 Juillet à WISSEMBOURG. Dans le SUNDGAU, le vol n'est pas encore amorcé.

Comme l'an dernier, l'activité de la Pyrale se manifeste d'une façon très inégale.

Des pontes sont actuellement déposées sur feuilles dans les cultures de la HARDT et leur nombre risque d'augmenter rapidement dans la période du 12 au 16 Juillet.

Compte tenu de la poussée végétative rapide des maïs, un traitement insecticide est conseillé à partir du 13 Juillet.

Commencer les traitements sur les cultures les plus avancées et de toute façon avant le dégagement complet des panicules mâles, de manière à ce que les cornets puissent retenir le maximum de granulés insecticides. Les granulés utilisables sont à base de D.D.T., d'Heptachlore ou de Fenitrothion. Leur dose d'emploi est de 30 kg de produit commercial à l'hectare.

Dans toutes les autres régions, attendre un nouvel avis pour intervenir.

BETTERAVES INDUSTRIELLES

CERCOSPORIOSE DE LA BETTERAVE

Une attaque précoce de Cercosporiose vient de se manifester sur la variété Préco-poly, dans la région de SPECHBACH-LE-HAUT (68). Un traitement fongicide devrait être réalisé dans les parcelles contaminées afin de limiter l'extension des premiers foyers existants. Utiliser de préférence un cupro-organique classique.

.../...

POMMES DE TERRE

DORYPHORE

De nouvelles larves sont présentes sur bien des cultures de la région de WISSEMBOURG (67) ainsi qu'en LORRAINE.

La lutte contre le Doryphore étant obligatoire, un traitement insecticide s'avère indispensable lorsque les larves atteignent la grosseur d'un grain de blé. Choisir l'un des produits figurant sur la liste en votre possession.

CULTURES LEGUMIERES DE PLEIN CHAMP

- CHOU A CHOUROUTE -

PUCERONS CENDRES

Les premières colonies de Pucerons cendrés sont déjà bien installées sur les choux à choucroute, notamment dans la zone productrice de RIEDWIHR.

Visiter les cultures et traiter en cas de nécessité, avec l'un des produits conseillés (Bulletin n° 114, rubrique Pucerons des cultures légumières). En cas de pulvérisation, ajouter un bon mouillant à la bouillie.

- NAVET -

MOUCHE DU CHOU SUR NAVET

Chaque année, la Mouche du chou cause des dégâts importants sur les navets semés tardivement et destinés à la fabrication de navets confits.

Le SUNDGAU semble plus particulièrement intéressé par ce ravageur.

Prévoir un traitement du sol avant semis, avec une spécialité à base de Chlorfenvinphos, à 6 kg de matière active à l'hectare, ou de Trichloronate, à la dose de 3,125 kg de matière active à l'hectare.

Le Responsable de la Station
D'Avertissements Agricoles :
C. GACHON.

L'Inspecteur de la
Protection des Végétaux :
J. HARRANGER.